

Ne pas confondre *Amanita ceciliae* et *Amanita beckeri*

Didier Huart

8, avenue de Champagne
62360 - CONDETTE

La sortie de la S.M.N.F en forêt de Desvres le 10 septembre 2006 nous a permis de confronter deux amanites appartenant au sous genre *Amanitopsis* et à la section *Inauratae* : *Amanita ceciliae* et *Amanita beckeri* donnée comme rare. Mais on peut se demander si cette dernière n'est pas plus fréquente que l'on ne croit à cause de sa confusion avec *Amanita ceciliae*. Cette année 2006 m'a donné l'occasion de récolter assez souvent et dans des stations différentes *Amanita beckeri* (nom donné en l'honneur de Georges Becker) aussi bien en forêt de Boulogne (parcelle 93) qu'en forêt de Desvres (parcelle 53) ce qui permet de bien faire la différence entre les 2 espèces.

On peut la résumer sous forme de tableau

	Amanita ceciliae	Amanita beckeri
chapeau	Taille : de 12 cm jusqu'à 20 cm pour Marcel Bon. Forme : <u>conicocampanulée</u> puis étalée ; marge très cannelée. Couleur : <i>brun jaune foncé, fauve olivacé.</i> Voile : <i>gros flocons grisâtres.</i>	Taille : <i>moins massive</i> que sa voisine ; jusqu'à 12 cm. Plus vite étalé que <i>ceciliae</i> ; marge striée, laissant apparaître la chair blanche sous-jacente. <i>Noisette, d'un brun plus chaud, brun rouge</i> <i>Restes de voile de plus petite taille, très épars, de couleur crème puis brun noisette.</i>
lames	Blanches, crème sale, peu serrées à arête floconneuse.	Blanches à arête finement fimbriée et ponctuée de brun.
stipe	75-150 mm x 15-20, brun gris , chiné, pelucheux de restes de voile. Le bulbe enserré dans <i>une volve fragile, étagée en bourrelets obliques, gris souris.</i>	<i>Moins robuste</i> : 100-200 mm x 12-20, droit, atténué vers le haut couvert de chinures blanches puis concolores au chapeau <i>Volve blanche vite brun noisette enserrant la base du stipe.</i>
écologie	D'après Régis Courtecuisse : feuillus, charmilles argilocalcaires. Fréquente dans toutes les forêts du Boulonnais.	Signalée en forêt de Boulogne et de Desvres.

Une bonne représentation de *Amanita ceciliae* dans le Philips p 22 ; p 295 M. Bon ; 823 p 272 Régis Courtecuisse.

Sur Internet, belle photo de *Amanita beckeri* sur le site de Jean-Jacques.Wuibaut mais la photo d'Yves Deneyer représente bien sûr *Amanita beckeri* et non *Amanita ceciliae*.

Souligner aussi le classement des 2 espèces sur la liste rouge : alors que *Amanita beckeri* est entrée dans la catégorie 4 ; *Amanita ceciliae* est curieusement en 3 alors qu'elle était classée en 2.



Amanita beckeri avec ses restes vélaire de très petite taille (photo Didier Huart)



Chapeau d'*Amanita ceciliae*



Pied d'*Amanita ceciliae*



Pied d'*Amanita beckeri*

Photos Jean-Pierre Gavériaux - forêt de Desvres - 10 septembre 2006